

PRODUKTDATABLAD

Tapin creme

Tapin virker ved at gøre hudoverfladen følelsesløs i en kort periode. Cremen anvendes på huden inden visse medicinske indgreb. Tapin medvirker til, at smerter i huden undgås, mens patienten stadig kan mærke tryk og berøring.



Tapin indeholder to aktive stoffer, som hedder lidocain og prilocain. Disse stoffer tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes for lokalnæstetika (lokalbedøvende lægemidler).

Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.

Ingredienser:	Aktivt stof: Lidocain 2,5% (25mg/g), Prilocain 2,5% (25mg/g) Øvrige indholdsstoffer: Polyoxylet og hydrogenet ricinusolie (Arlatone G), Carbomer (Carbopol 680 NF), natriumhydroxid, og renset vand
Indikation:	Hos voksne, unge og børn kan Tapin anvendes til at gøre huden følelsesløs inden indstik af en kanyle og mindre hudoperationer. Hos voksne og unge kan Tapin også anvendes til at gøre kønsorganerne følelsesløse inden en indsprøjtning eller medicinske indgreb, såsom fjernelse af vorter. OBS: Brug af Tapin på kønsorganerne skal foregå under opsyn af en læge eller sygeplejerske. Hos voksne kan Tapin yderligere anvendes til at gøre huden følelsesløs inden rensning eller fjernelse af beskadiget hud i forbindelse med bensår.
Dosering:	Den sædvanlige dosis til voksne og unge over 12 år er 2g creme
Kontraindikationer:	Hemiglobinæmi og allergi overfor indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen
Advarsler og forsigtighedsregler:	Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonale før brug, hvis: <ul style="list-style-type: none">• Du eller dit barn lider af glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel• Du eller dit barn lider af methæmoglobinæmi• Brug ikke Tapin på områder med hududslæt, rifter, hudafskrabninger eller andre åbne sår, med undtagelse af bensår. Hvis et eller flere af disse problemer er til stede, bør du rådgives af en læge eller apotekspersonale før brug af cremen• Du eller dit barn lider af eksem med kløe (atopisk dermatit), da cremen i så fald skal virke på huden i en kortere periode end ellers. Efterlades cremen på huden i over 30 minutter, kan det medføre en øget forekomst af lokale hudreaktioner• Du tager bestemte lægemidler mod forstyrrelser i hjerterytmen (klasse III-antiarytmia, f.eks. amiodaron). I dette tilfælde vil lægen følge din hjertefunktion nøje.

Da absorptionen kan være øget ved brug på nybarberet hud, er det vigtigt at følge de

PRODUKTDATABLAD

Tapin creme

anbefalede doser, hudområder og virkningstider.

Undgå at Tapin kommer i kontakt med øjnene, da det kan medføre irritation. Hvis dette sker, bør øjet omgående skylles grundigt med lunkent vand eller en saltopløsning. Indtil følelsen kommer tilbage, bør intet komme i kontakt med øjet.

Tapin må ikke anvendes på en svækket trommehinde.

Når du bruger Tapin, inden du skal vaccineres med en levende vaccine, skal du have kontrolleret vaccinationsresultatet hos en læge eller sygeplejerske efter en bestemt periode.

Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn og ved temperaturer under 25°C
Holdbarhed:	6 måneder efter åbning. Se holdbarhedsdato på emballagen.
Håndtering og destruktion:	Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
7552173	Tapin	Håndkøbsmedicin 5x5g Lidocain, 2,5% + Prilocain	30g tube	Æske a 5 stk.	501461

ANSVARLIGT FIRMA

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.