

PRODUKTDATABLAD

Treo, brustablet

Treo er en brustablet mod svage smerter og migræne, fx hovedpine, muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter og tandpine. Det virker også febernedsættende. Med Treo kan du hurtigt fjerne smerterne og brustabletterne virker inden for 20-30 minutter. Treo indeholder en kombination af acetylsalicylsyre og koffein. Acetylsalicylsyren virker bl.a. smertestillende og koffeinen forstærker den smertestillende effekt. Brustabletten findes i to varianter, Treo og Treo Citrus.



Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.

Brustabletter: 1 brustablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre (ASA) og 50 mg koffein, vandfri citronsyre, natriumhydrogencarbonat, vandfri natriumcarbonat, natriumdihydrogencitrat, natriumcitrat, mannitol, docusatnatrium, povidon, simeticon.

Ingredienser:

Treo[®] Citrus, brustabletter: 1 brustablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre (ASA) og 50 mg koffein, vandfri citronsyre, natriumhydrogencarbonat, vandfri natriumcarbonat, natriumdihydrogencitrat, natriumcitrat, mannitol, docusatnatrium, povidon, simeticon.

Indikation:

Anvendes med mod svage smerter f.eks. hovedpine, muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter og tandpine. Du kan også tage Treo mod migræne.

Ved migræne anbefales voksne at tage 2 brustabletter højst 4 gange dagligt. Treo bør højst anvendes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Ved smerter anbefales voksne at tage 1 - 2 brustabletter højst 4 gange dagligt.

Dosering:

Du må kun bruge Treo til børn under 15 år efter lægens anvisning. **Brug aldrig Treo til børn under 15 år, hvis de har feber.**

Opløse brustabletten i ½ glas vand. Lad opløsningen bruse færdig, før du drikker den. Virkningen bliver ikke bedre med mere end 2 tabletter ad gangen. Treo virker i 4-6 timer.

Kontraindikationer:

Stærkt nedsat hjerte- og leverfunktion, stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min), svær hypertension, frisk gastro-intestinal blødning, hæmoragisk diatese, trombocytopeni, antikoagulationsbehandling astma eller andre allergiske symptomer udløst af ASA eller andre NSAID.

Advarsler og

forsigtighedsregler:

Ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion bør Treo ikke anvendes.

PRODUKTDATABLAD

Treo, brystablet

Opbevaring: Utilgængeligt for børn og ved almindelige temperaturer

Holdbarhed: Se holdbarhedsdato på emballagen.

**Håndtering og
destruktion:** Aflever altid medicin rester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7551010	Treo tabletter neutral	Håndkøbsmedicin	500 mg	Rør a 10 stk.	596557
7551011	Treo tabletter citrus	Håndkøbsmedicin	500 mg	Rør a 10 stk.	162125

ANSVARLIGT FIRMA

Hermes Arzneimittel GmbH, Georg-Kalb-Straße 5-8,
82049 Großhesselohe, München, Tyskland.